

Billes et bulles

Quelles sont les questions scientifiques ou techniques ?

Vitesse de chute de particules solides ou de remontée de bulles dans l'eau.

Par quelles expériences y répondre ?

Sédimentation de billes ou de bulles isolées. Bulles confinées dans un tube. Bulles toriques.

Quelles techniques expérimentales ?


Acquisition vidéo puis analyse d'image.

Quels sont les résultats ?

À vous de les montrer à travers des graphes clairs.

Comment les interpréter ?

Ingrédients physiques, lois d'échelle, ajustement de courbes expérimentales : à vous de jouer !



Introduction

L'ascension de bulles d'air dans un réservoir de liquide est couramment utilisée dans des procédés industriels ou biochimiques pour l'agitation (dans les fours à verre par exemple), le transfert d'oxygène, la flottation des minerais. Dans cette expérience, nous nous attacherons à caractériser la dynamique d'ascension de bulles d'air dans l'eau dans des gammes de taille allant du mm à quelques cm. Vue de loin, l'ascension d'une bulle dans un liquide devrait être équivalente à la chute d'une bille. Il suffirait juste d'inverser la gravité. Le passage d'un problème à l'autre est-il cependant aussi simple ?

1 Billes

Attention : commencer par placer l'épuisette de repêchage dans la cuve !

Lâcher des billes de même densité et mesurer leur vitesse de chute avec des acquisitions vidéo. Comment la vitesse évolue-t-elle en fonction du rayon ? Essayer avec des billes de densité différente. Quel est l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds mis en jeu ? Peut-on superposer toutes les mesures expérimentales sur une même courbe maîtresse ? En déduire une estimation du coefficient de traînée des billes.

2 Bulles libres

Produire des bulles à partir des injecteurs de différents diamètres. Mesurer leur vitesse de remontée et analyser leur trajectoire. Montent-elles tout droit ? Observer leur forme en fonction de leur taille.

Comment la vitesse de remontée varie-t-elle avec le volume V des bulles et leur rayon équivalent $R_e = (3V/4\pi)^{1/3}$? Les résultats expérimentaux sont-ils en bon accord avec la loi obtenue pour les billes? Proposer un mécanisme qui permet d'expliquer au premier ordre les résultats observés.

3 Bulles confinées

Produire des bulles dans les tubes de différents diamètres et mesurer leur vitesse de remontée. Cette vitesse est-elle stationnaire? dépend-elle de la longueur des bulles (contrôlable par l'électrovanne), du rayon du tube? Déterminer l'ordre de grandeur du nombre de Reynolds et du nombre de Weber pour ces écoulements. Quels sont les paramètres physiques dominants?

Peut-on décrire la vitesse de remontée par une loi d'échelle? Les résultats sont-ils compatibles avec l'étude de G.I.Taylor? (n'hésitez pas à demander ce document s'il n'est plus dans la pochette)

4 Bulles toriques

Il est également possible de produire des bulles annulaires grâce à l'électrovanne. On pourra décrire ce régime de bulle contra-intuitif : vitesse de remontée, élargissement du diamètre... Essayer de décrire qualitativement l'écoulement autour de l'anneau en suivant des poussières. Proposer un mécanisme qui permet de stabiliser la forme torique?

Production des bulles et mesure des volumes.

Pour produire de petites bulles, utilisez la rampe d'injecteurs raccordée à un pousse-seringue. L'ordre de grandeur du débit approprié est autour de 1000 $\mu\text{l}/\text{min}$, mais il faudra l'ajuster pour chaque tube.

L'affichage du volume éjecté par le pousse-seringue permet d'estimer le volume moyen d'une bulle.

Pour produire des bulles stables de plus grande taille, il est nécessaire d'utiliser les tubes fixés sur des embases. Placer le tube au-dessus de l'orifice d'injection d'air au fond de la cuve.

L'admission d'air est commandée par une électrovanne. Son temps d'ouverture et la fréquence de répétition sont réglés par un générateur de fonction (la fréquence du signal définit la fréquence d'émission des bulles) et par un générateur d'impulsion (la durée de l'impulsion électrique, typiquement de la dizaine de ms, règle le temps d'ouverture de l'électrovanne). Attention : l'amplitude des impulsions doit être de 2.5V, veiller à ne pas dépasser cette valeur.

Dimensions des tubes :

- Tube n°1 Diamètre intérieur : 14,7 mm Longueur 44 cm
- Tube n°2 Diamètre intérieur : 20 mm Longueur 31 cm
- Tube n°3 Diamètre intérieur : 21 mm Longueur 79 cm
- Tube n°2 Diamètre intérieur : 34 mm Longueur 46 cm

Acquisition et traitement des images

Vous pouvez enregistrer l'ascension des bulles grâce à un caméscope numérique. Les séquences d'image peuvent être transférées sur ordinateur avec l'application iMovie.

iMovie permet un certain nombre de manipulations sur les séquences vidéo, mais pas un traitement numérique quantitatif. Pour cela, il faut exporter les vidéos en séquences d'images qui sont relues et traitées avec le logiciel ImageJ (document en annexe).